



11
No. 6




Memoire sur L'application
Cognitive de Leponge pour arreter
Les hemorrhagies. Lu a la Societe
royale de Londres le 11^e et 18^e
Fevrier 1762. par M. Whitte
de la Societe royale, du Corps des
Chirurgiens de Londres, et
Chirurgien de l'infirmerie de
Manchester.



ARC 20 d. 41





Le Moyen D'arreter les
hemorrhagies occasionées par les grandes
operations de chirurgie, a été
tout temps fixé l'attention de
ceux qui ont été employez dans
les Differentes branches de
l'art de guerir. Les anciens
faisoient, a la Verité, usage
des Substances fongueuses;
mais ils n'avoient pas l'avantage
de Connoître la Circulation du
sang, ny l'usage du Courbiquet.
ils avoient recours au Caustere
actuel et potentiel, et ils se
trouvoient qu'en dans les amputations,
Coupoient les chairs avec un
Couteau Rouge au feu, & afin
d'arreter ou plutôt de prevenir
l'effusion du sang.



on appliquoit aussi des styptiques
et des astringents de toute
espece; mais l'insuffisance de
ces applications jointe a la
Cruauté de quelques unes, et le
mauvais état dans lequel les
moignons restoient la plupart
de temps par la grande perte
de substance, firent abandonner
ces différentes méthodes pour
embrasser celle de la suture
qu'on faisoit avec ou sans
aiguille. C'est à ambroise
pare que nous sommes redevables
de ~~ce~~ sa découverte. Il se
crut d'abord inspiré du Ciel,
et il le fit par avec franchise;
mais les Contemporains d'un
ayant fait effuyer bien et
contrariété, il entreprit de prouver
pour se défendre, que la méthode
avoit été pratiquée par les anciens;
mais ce fut en vain. Il ne put s'ôter une réputation

qu'il méritoit si bien. La Méthode
de la ligature fit des progrès, et
pendant plus d'un demy siècle, elle
fut regardée dans toutes les parties
de l'Europe où l'on Cultivoit la
Chirurgie, Comme Le Meilleur moyen
d'arrêter une hémorragie après la
division des grandes artères.

Depuis ce temps là on y a ~~apporté~~
apporté quelque changement, surtout
celui de substituer une aiguille
Courbe à une aiguille droite; Car
quoique ~~par~~ se servit d'une aiguille
Courbe pour faire la suture dans
les plaies profondes, il ne
employoit jamais que de droites
pour lier les vaisseaux dans
les Cas où le Bec à Corbin
ne pouvoit servir.

Malgré cela cette méthode n'a pas
laissé d'avoir des grands inconvénients.



Car Devenu de la plume de Cui
qui ont souffert l'amputation, la
ligature en ~~Leider~~^{mouvent} le plus douloureux
de l'opération, etc. * il arrive
« quelque fois dans les grands Moignons
« que dix Vaisseaux ou même —
« d'avantage se ligent. « elle a été
quelque fois suivie de Convulsions,
de la Constriction des mâchoires,
de la mort même. † Souvent aussi
elle n'a été d'aucune utilité lorsque
les parties ont été déchirées, et
Contuses, & quand les extrémités des
Vaisseaux ~~se~~ sont ~~trouvées~~ hors
de la portée de l'aiguille, ou bien
lorsqu'une hémorragie est survenue
quelques jours après l'opération,
qu'il y a eu une suppuration
abondante, et que les parties
ont été ~~dans~~ dans un état qui ne leur
permettait pas de souffrir l'application
réitérée de l'aiguille. un Cas
semblable à ce Dernier arriva

* Chirurgie de Sharp, p. 218. Ed. 8.

† observations de chir. de Warner, Ed. 3. p. 350.

au Marquis de Prothelin * apres
L'amputation de la Cuisse, et donna
Lieu a une invention tres ingenieuse
de M. Detet. Son instrument
qui fut fixé sur l'extrémité du
moignon fit une compression Constante
sur les Vaisseaux, sauva la Vie
du Marquis, et Combla d'honneur
Ce Celebre chirurgien.

M^{rs}. Lotterie, et Belloque † ont
aussi inventé des Machines pour
arrêter par le ^{seours} ~~Marquis~~ de la
Compression des hemorrhagies
occasionnées par l'ouverture des
arteres intercostales, de meme
que M. Souven ‡ pour arrêter
Celles qui surviennent apres
l'extraction des dents.

-
- * Mem. L'Acad. des Sciences, ann. 1731. p. 123.
† Mem. de L'Acad. Roy. de Chir. Tom. II.
‡ ib. Com. III. p. 27.



On se souvient servi avec succès de
Compresses graduées. elles suffisent
bien pour remplir les vides des
praticiens dans les playes de
tête, et de beaucoup d'autres endroits
ou un bandage serré n'est pas ~~propre~~
^{sujet} à nuire aux parties
voisines; et quoiqu'il y ait peut-être
peu d'arteres dont l'hémorragie
ne puisse être arrêtée par une
Compression exacte faite avec soin
et jugement, même sans quelle ait
l'inconvénient des autres méthodes,
Néanmoins l'exactitude nécessaire
pour en déterminer le degré convenable;
le danger * qu'il y a de trop serrer
le Bandage dans les amputations,
la longueur du temps souvent indispensable
pour continuer la compression;
la difficulté d'examiner la playe
sans lever le Tourniquet à
chaque pansement; la fin de risquer
que le Malade courra si les

*. Voyez de Médec. Edin. Vol. 4. art. 22. p. 270.

Compresses viennent à être dérangées,
par quelque accident ordinaire,
~~comme cela peut très bien arriver,~~
font autant de considérations qui
ont jusqu'ici empêché le moyen
de la compression de passer
la méthode générale.

Les inconvénients qui résultent de
ces différents genres d'opération
faisaient généralement souhaiter
qu'on pût découvrir un moyen
plus sûr, et plus facile d'arrêter
les hémorragies, lorsque les
espérances du public furent ^{flattées} ~~augmentées~~,
par M. Brohard que la
M. très chr. Neompensa
largement d'avoir fait la découverte
de l'agaric de chine. Les vœux
les plus ardents paraissent alors
être braver, et la plupart des
chirurgiens ^{ambassadeurs} ~~représentants~~ la
découverte avec la plus grande



avidité.

Cependant une expérience réfléchie,
et des observations répétées nous
ont convaincu que l'agarie est
insuffisant dans plusieurs Cas;
et que souvent dans ceux où il
paroitroit avoir été heureusement
employé, les sucs dépendent
autant de la compression, que
des qualités de la plante. D'ailleurs
Comme on n'est pas toujours
assuré qu'il reste sur l'embouchure
des Vaisseaux divisés, et en
fort incommode pour ceux qui
l'emploient de ne pouvoir compter
sur lui sans être obligés de
Veiller avec le plus grand Soins
et la plus grande assiduité.
et se voir élevé à une autre
difficulté. Car celle de se procurer
la tout temps le véritable agarie;

Car Comme M. Warner *
La tres bien observe, le chesne En
produit deux sortes ~~de~~. L'un
a l'apparence d'un cuir molle
ayant un Duvel a la surface
semblable a celui du Velours;
L'autre est l'pais, rude, et dur.
Il y a encore une autre substance
longueuse qu'on prend quelquefois
pour l'agaric, et qui paroit estre
celuy qui en devit par
Breignius sous le nom de
fungus Coriacus quercinus
hematodes. J'hes ay employe
tous, si je ne me trompe, et
suivant moy, cette derniere substance
est preferable a l'agaric.

Le Liopardon et le fungus
vinosus ont ete ^{aussi} mis en usage;
Mais toutes ces applications
sont aujourd'huy rejettees dans
* observations de chis. p. 356.



les playes des grandes arteres; et
les chirurgiens se trouvent bien
forés d'avoir Recours a la ligature
malgré les inconveniens.

Il y a ^{encore} un autre Remede que
je crois qu'il en est mon devoir
de mettre sous les yeux du
public. il n'est point sujet
a aucune des objections ~~que~~ ^{dont} je
viens de ~~parler~~ ^{parler}, au moins autant
que j'ay pu observer. L'application
en est parfaitement sure, et
faile, et les effets en sont plus
Certains que la Ligature même.
Il n'est autre chose que le Dedans
de l'éponge ~~de~~ Nouvelle, et
bien seichée.

Je ne pretens pas m'attribuer le
merite d'estre le premier qui se
servi de l'éponge pour arreter les
hemorragies. Les anciens en faisoient
usage, et rarement en medecine

pour d'autres usages occasions.
Dioscoride nous dit que L'éponge
recente Consolide Les playes, et
Les ulcères fistuleux, et arrête
Les hémorragies. on s'en servoit ^{Les} Intérieurement des Cendres, ~~de~~.

Galien Les Recommande Comme
un p^uissant astringent. Il
nous apprend que de ses maîtres
on portoit toujours sur eux, qu'il
en faisoit brulles avec de la
poix pour en appliquer les cendres
chaudes, Comme un Cautère, ou un
Caustique lorsqu'il s'agissoit d'arrêter
Le sang après quelque opération
de chirurgie.

Entre Les Modernes, Dale * nous Montre
dans sa pharmacologie, qu'on —
N'emploie jamais intérieurement,
ou du moins fort rarement L'éponge;
mais que Les Chirurgiens en feroient
un usage fréquent pour arrêter Le sang.



Miller * dans la Bot. offic.
nous dit que les chirurgiens
des Employez dans les Embrocations,
et pour les hemorrhagies. Je ne
dois pas passer sous silence, que
Mr. Reid de Chelsea Rapport
à la Société Royale que Mr.
Cheselden après l'operation de
la Taille dans l'année 1741-2,
mit dans la playe qui saignoit
trop fort un morceau mince
de sponge mouillée afin que le
sang passât à travers la substance
poreuse, et que contre son attente
~~elle~~ arrêtât le sang. à Cela —
j'ajouterois que Mr. Morand dit
quelque chose de quelques expériences
faites sur des chiens, avec sponges,

* page 424.
† à la fin de l'année 1751. on fit
des expériences sur des chiens avec
Lagarie de chesne qui avoit déjà
servi pour la même fin, après
l'avoir lavé, et fait seicher de
nouveau. on la fit aussi avec
Lagarie de bette, de brouleau, avec

et d'autres Substances spongieuses; Mais
je ne trouve point ailleurs que —
L'éponge ait été employée seule
dans Les playes des grandes artères

La poudre de Lycoperdon soutenue,
de quelques Morceaux de la partie
spongieuse. on la fit avec Ces
mêmes Morceaux seuls, avec du
Bois pourri, et enfin avec des petite
morceaux d'éponge fine. Il resulta
de tous Ces Essais que l'agaric
de chesne qui avoit déjà servi
ne réussit pas si bien que le
nouveau; que Les autres agarics, que
la poudre ainsi que la partie —
spongieuse du Lycoperdon, et le bois
pourri eurent à peu près le même
effet. Ces différentes préparations
n'étant point soutenues et la
Compression manquèrent toutes.
L'éponge ^{ordinaire} commune parut d'abord produire
le même effet; mais elle manqua
comme les autres. On trouve le
détail de Ces expériences dans un
ouvrage périodique imprimé à Paris.
Tous le titre de Journal Economique.
Voyez le mois d'Avril, et de Juin 1752.

De la Maniere dont je me sers.

Boerhaave Compte jusqu'à
dix sept sortes d'éponge. Celle
dont je me sers est serrée, —
Compacte et légèrement poreuse,
on l'appelle communément éponge
male, ou fine. Il la désignée,
si je ne me trompe dans son
ind. att. plant. * Sous le Nom
de Spongia, ad usum præstantissima,
foraminibus exiguis peruvia, Courn. 575.
L'Archypell nous fournit la
Meilleure.

L'éponge ne demande d'autre —
préparation que celle d'être —
parfaitement séchée. Cette
Condition est absolument nécessaire

"L'auteur ny est point nommé,
Mémoires de l'Académie Roy.
de chirurgie. Ed. Angl. par
Neale Vol. ii page 86.

* page 8.

quand il s'agit d'arrêter les —
hémorragies des grandes artères
surtout dans un temps humide;
Car il n'y a point de substances
qui s'imbibe plus que celle-ci de
l'humidité de l'air, Comme il paraît †
quand on la fait servir en quinze
d'hygromètre. lorsqu'on la fera
sécher on ~~est~~ prendra garde
qu'elle soit assez éloignée du feu
pour qu'elle ne se froisse pas par
les effets de chaleur, et on la conservera
dans l'endroit le plus sec qu'on
pourra trouver. Je me suis servi

† « une livre d'éponge pesée dans
« un temps humide, ne pèsera qu'onze
« onces, si on la fait sécher avec
« soin dans une étuve sans altérer
« la texture. Cham. Suppl. art. ~~de~~ nouvelles.

J'achetai trente deux éponges
qui paroissent être bien sèches.
rendues à la maison, elles pèsèrent
huit onces, ^{mais} après avoir demeuré
pendant quelques heures devant le feu,
elles furent réduites au poids de six.



avec l'une de la partie intérieure
de la spongie sans l'avoir fait
sécher, pour arrêter le sang des
petites artères. elle suffit dans
ces cas là d'autant mieux quelle
se détache plus facilement de
la spongie, mais il faut remarquer
qu'on diminue son action sur les
vaisseaux à proportion qu'on
diminue sa qualité adhésive.
C'est cette propriété qui lui donne
tant de mérite, & par conséquent
la supériorité quelle a sur l'agaric.
ainsi c'est de la texture de ses
parties, et non pas de quelque
qualité styptique, ou astringente
qu'elle tire sa valeur.

M. Petit, ainsi que ses sectateurs
ont imaginé que l'ouvrage de la
nature dans la suppression d'une
hémorragie consiste dans un Coagulum
ou Caillot de sang formé à l'extrémité
de l'artère, qui s'étend en haut & en longueur
de quatre, cinq, ou six pouces
en manière de Cone dont

La base en du côté de la division.
Cet auteur* a donné la figure d'un de
ces petits Caillots tiré de l'artere d'un homme
qui l'avoit ouverte apres la mort. Il en
est plus probable que le Coagulum se soit
formé seulement ala mort du malade, son
hypothese étant sujette a plusieurs
objections.

M. Bouteau† a présenté une opinion plus
vraisemblable. Il pense que le gonflement
du Tissue Cellulaire qui environne l'artere,
porte les parois du Vaisseau a se toucher,
et empêche par ce moyen le sang de
s'échapper. Il a fait l'ouverture de plusieurs
arteres où il ne point vu de Coagulum.
Il l'a trouvé dans d'autres qui paroissoient
avoir été formés comme les polypes

* Mem. de l'Acad. des Sciences année 1731.

† Melanges de chirurgie, a Lyon 1760, p. 314.



Dans le temps que le liget se mourait
ou apres la mort.

Le Docteur Monro * fait aussi
mention du gonflement de la Membrane
Cellulaire dans ses remarques sur les
amputations.

* Aussitot, dit il, que la ligature est faite,
la substance Cellulaire qui est au delà du noeud,
Prenant encore une Communication avec les
Cellules voisines, se gonfle, et se ^{durcit} ~~durcit~~
de maniere qu'il empêche le fil de glisser.
